

**Как часто практикующие врачи
назначают пробиотики в схемах
эрадикации *H. Pylori*?
Данные опроса.**

Кононова


Алла Геннадьевна

Доцент кафедры общей врачебной практики и
семейной медицины ФБОУ ВО «Тверской ГМУ»

МЗ России,

врач-гастроэнтеролог ВМП-клиники, г.Тверь

- В исследовании приняли добровольное участие **386 практикующих врачей (264 терапевта, 52 гастроэнтеролога, 63 врача общей практики и 7 гериатров)**
- Данные были получены на основе онлайн опроса, включавшего позиции, предусматривавшие одиночный выбор из предложенных вариантов ответов.




Инфекция *H. Pylori*

А – требует обязательной эрадикации антибиотиками во всех случаях обнаружения 78%

В – может быть вылечен про- и пре- биотическими препаратами 13%

С – может быть вылечен народными средствами 1%

Д - не требует обязательной эрадикации 8%




Назначаете ли Вы пробиотики при проведении эрадикационной терапии?



А – да, на период антибиотикотерапии - 19%

Б – да, на период антибиотикотерапии и после нее - 68%

В – нет, не назначаю - 13%



Назначение пробиотиков



ВЫВОДЫ



- Пробиотические препараты являются популярным адъювантом в схемах эрадикации *H.pylori* в реальной клинической практике (87%), при этом врачи предпочитают мультиштаммовые препараты (74%)
- При назначении пробиотика в схемах эрадикации 68% специалистов пролонгируют их назначение после отмены антибактериальных препаратов
- Опрос выявил **необходимость повышения приверженности специалистов** к соблюдению протоколов лечения в соответствии со стратегией «test-and-treat»!