

Синдром Брадиэнтерии и Коморбидность

Шемеровский К.А.

*Частное Образовательное Учреждение Высшего Образования
Санкт-Петербургский Медико-Социальный институт, Санкт-Петербург*



VII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием

**«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ»**

8–9 сентября 2023 года

Формат: очный с онлайн трансляцией


Место проведения: Санкт-Петербург,
отель «Введенский», Большой проспект П.С., д. 37

<https://www.gastro-gepa.ru>

22-31 десятилетие науки и технологии



Встречаемость Артериальной Гипертензии у лиц с регулярным и нерегулярным ритмом кишечника



Ритм кишечника

N = 58, 49 женщин, 24-70 лет,

Артериальная Гипертензия встречалась у 12% лиц с регулярным ритмом кишечника


Артериальная гипертензия встречалась у 34% лиц с нерегулярным ритмом кишечника.

Запор повышал риск АГ почти в 3 раза!!! (в 2,8 раза)


Шемеровский К.А.

Ученые записки, Том XVI, №4, 2009, 136-139.

Риск ожирения и регулярность стула



Регулярный
стул - 7 раз в неделю





Нерегулярный
стул 1- 6 раз в неделю

■ **Норма** ■ **Избыток** ■ **Ожирение**

Нерегулярный (неежедневный) стул повышает риск ожирения в 3,4 раза

Зависимость встречаемости Тревоги и Депрессии от частоты стула при Метаболическом Синдроме




Тревога и Депрессия диагностированы почти у каждого десятого пациента с I стадией КОНСТИПАЦИИ


Синдром Брадиэнтерии и Колоректальный Рак

(Синдром Брадиэнтерии доминирует в 30-60 лет, Колоректальный Рак доминирует в 50-80 лет)

**Age-related incidence
of Bradyenteria Syndrom**
(Stool frequency - 3-4 stools per week)



**Age-related incidence
of Colorectal Cancer,**
II stage (5%), III - IV stages (95%)



ВЫВОД:

Синдром Брадиэнтерии является индуктором коморбидности, так как повышает риск возникновения 4-х видов болезней:

Артериальной Гипертензии – почти в 3 раза,

Абдоминального Ожирения – почти в 3 раза,

Тревоги и Депрессии – прогредиентно по частоте стула,

Колоректального Рака – предшествуя Раку на 20-30 лет.

Лит:

1. *Шемеровский К.А.* Ученые записки, Том XVI, №4, 2009, 136-139.
2. *Шемеровский К.А., Фирова Э.М.* Уровни тревоги и депрессии у пациентов с метаболическим синдромом. Мед. Акад. Журнал, 2013, спец вып, С 83-84.
3. *Shemerovskii K.* Advances in Gerontology, 2007, V 20, N 3.