



ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова Минздрава России

Кафедра пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии им. С.М. Рысса

VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Зимняя школа воспалительных заболеваний кишечника»

СРК-подобные симптомы у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

Адамова Д.В., ординатор 2 года обучения по специальности «Гастроэнтерология»

Оганезова И.А., профессор, доктор медицинских наук


27 февраля 2024 года, Санкт-Петербург

Распространенность СРК-подобных симптомов у пациентов с ВЗК

Источник	СРК-симптомы (%)	Источник	СРК-симптомы (%)
Simrén M, Axelsson J, Gillberg R. et al. // Am J Gastroenterol. 2002 Feb; 97(2):389-96.	Всего: 44.6	Jelsness-Jørgensen LP, Bernklev T, Moum B. // J Psychosom Res. 2012;73:469-472	Всего: 33.7
	БК: 57		БК: 28.6
	ЯК: 33		ЯК: 36.1
Zaman MS, Robson KM, Lembo AJ. // Am J Gastroenterol. 2002;97 Suppl:S284.	Всего: 63.6	Kim ES, Cho KB, Park KS et al. // J Clin Gastroenterol. 2013;47:e38-e44	Всего: 36.3
	БК: 66.7		БК: 46.7
	ЯК: 60		ЯК: 26.9
Minderhoud IM, Oldenburg B, Wismeijer JA et al. // Dig Dis Sci. 2004;49:469-474	Всего: 34.6	Berrill JW, Green JT, Hood K, Campbell AK // Aliment Pharmacol Ther. 2013 Jul; 38(1):44-51	Всего: 32
	БК: 41.7		БК: 32.5
	ЯК: 31.5		ЯК: 31.6
Keohane J, O'Mahony C, O'Mahony L. et al. // Am J Gastroenterol. 2010 Aug; 105(8):1788, 1789-94; quiz 1795.	Всего: 50.9	Vivinus-Nébot M, Frin-Mathy G, Bziouche H et al. // Gut. 2014; 63:744-752	Всего: 36.7
	БК: 59.7		БК: 35.4
	ЯК: 38.6		ЯК: 38

**Всего обследовано 1836 пациентов с ВЗК в стадии ремиссии
СРК-подобные симптомы выявлены у 38,1% пациентов с болезнью Крона и у 27,8%
пациентов с язвенным колитом**

Патогенетический *Overlap*: СРК-подобные симптомы при ВЗК







СРК vs ВЗК: есть ли связь?

- Оба расстройства имеют семейную агрегацию
- Оба расстройства имеют сходные симптомы
- Симптомы часто перекрещиваются у одних и тех же пациентов
- Некоторые патогенетические факторы являются общими для обоих расстройствах
- Признаки субклинического воспаления характерны для СРК и коррелируют с интенсивностью болевого синдрома
- Наиболее тесную взаимосвязь с СРК-подобными симптомами демонстрируют два основных патофизиологических механизма: полиморфизм генов, кодирующих про- или противовоспалительные цитокины, и психологические факторы, такие как тревога, депрессия, соматизация и невротизм
- Учитывая все вышесказанное, взаимоотношения между СРК и ВЗК , вероятно, могут быть более чем простым совпадением

Клиника им. П. Великого, отделение гастроэнтерологии
 Опрошено 12 пациентов с диагнозом ВЗК (50% БК, 50% ЯК)
 Средний возраст 41 год, мужчин 58% (7 человек), женщин 42% (5 человек)

**ROME IV DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE FOR ADULTS
 IRRITABLE BOWEL SYNDROME MODULE**



Результаты собственного исследования

Возможности мультитаргетного воздействия на СРК-подобные симптомы

