



ФГБУ ВО СЗГМУ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА МИНЗДРАВА РОССИИ

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ДИСПЕПСИИ

Серкова М.Ю., Семёнова Е.А., Алексеева Е. В., Карелкина В.К.
Санкт-Петербург, 2024

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:


- Определить уровень активности лактазы в биоптатах СО ДПК с использованием экспресс-теста LIQT
- Оценить частоту встречаемости ЛН у пациентов с диспепсическими расстройствами

МАТЕРИАЛЫ: биоптаты слизистой оболочки постбульбарного отдела ДПК 100 пациентов обоих полов (69% женщин, 31% мужчин) от 18 до 60 лет с диспепсическими симптомами и клиническим подозрением на ЛН, направленных на ЭГДС в «Клинику высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова».


МЕТОДЫ: экспресс тест Biohit LIQT для определения активности лактазы; опросник для оценки клинико-anamнестических данных

Результаты


Результат экспресс теста Biohit LIQT



Гиполактазия лёгкой степени




Наличие симптомов заболевания




РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Жалобы пациентов с гиполактазией лёгкой степени



Жалобы у пациентов с гиполактазией тяжёлой степени



Выводы:

- ❖ В результате исследования биопсийного материала пациентов, предъявляющих жалобы диспептического характера посредством экспресс теста Biohit LIQT более, чем в 40 % случаев выявлена гиполактазия разной степени тяжести
- ❖ Чаще всего пациенты с гиполактазией легкой степени предъявляли жалобы на вздутие живота, боли в животе, метеоризм
- ❖ В структуре жалоб пациентов с гиполактазией тяжелой степени, преобладают жалобы на послабление стула, слабость, высыпания на коже, метеоризм, боли в животе
- ❖ Данные жалобы усиливаются при приеме в пищу молочных продуктов, при этом, усиление симптомов зависит от количества употребляемых молочных продуктов
- ❖ У 42% пациентов гиполактазия имеет бессимптомное течение

Спасибо за внимание!

